

코로나 19 백신 접종을 하신 분께

~예방접종 후 (특히 접종직후~수일간) 건강상태에 신경쓰시다~


백신 접종 후, 15분 이상 접종기관에 머무르며 이상반응이 나타나는지를 관찰합니다.

(과거에 심한 알레르기 증상 (아나필락시스 포함) 및 채혈 등으로 실신이나 이상반응을 느끼시는 분은 30분 정도 접종기관에 머물러 주십시오.)

접종 후 발생할 수 있는 증상 (접종자의 10% 이상 발생)

본 백신은 근육 주사이므로 통증과 부기 등의 가벼운 부작용이 발생할 수 있으며, 일반적으로 며칠 내에 호전됩니다. 필요에 따라 해열 진통제를 복용하는 등 건강 상태를 관찰합니다. (일상생활에 지장을 초래할 정도의 중증이 발생할 비율은 극히 드뭅니다.)

【증상의 발현 상황, 시기, 지속 기간】

증상																		
	통증	부기	설사	근육통	관절통	두통	피로	오한	발열									
발현비율	84.3%	10.6%	15.5%	37.9%	23.7%	55.1%	62.9%	32.4%	14.8%									
발현시기	접종 당일			접종 다음날														
지속기간	약 2 일			약 1 일														

【중증 발현상황】

중증	통증	부기	설사	근육통	관절통	두통	피로	오한	발열
발현비율	1.5%	0.4%	0.3%	1.8%	0.9%	2.4%	4.2%	1.8%	-

출처: 해외 제 I / II / III상 시험 (C4591001 시험) 및 국내 제 I / II상 시험 (C4591005 시험)

이 백신은 2 회 접종을 해야 합니다. 이러한 증상의 대부분은 1 차 접종보다 2 차 접종 시에 더 높은 빈도로 나타난다고 합니다. 또한, 부작용이 발생하는 것은 면역 반응의 효과로 볼 수

위와 같은 증상이 지속되거나 평소와 다른 이상 증상이 나타날 경우, 접종한 의료기관과 주치의 또는, 오사카부의 전문 상담 창구로 상담 하십시오. 심한 통증·부기, 고열 등 증상이 심해질 경우에는 내원하여 진료를 받으십시오.

있으며 정상적으로 면역력이 생성되고 있다는 증거라고도 할 수 있습니다.

작성

국제교류협회 네트워크 오사카

☎06-6966-2400

이 전단지 는 사이타마현의 협력을 통해 다국어 정보 제공을 목적으로 국제교류협회 네트워크 오사카가 작성하고 있습니다.

접종 후 발생할 수 있는 중증 부작용 (빈도 불명)

【증상의 발현상황, 시기】

- 백신 접종 직후부터, 또는 5 분 이내, 보통 30 분 이내에 다음과 같은 증상이 나타난다면 쇼크, 아나필락시스 반응으로 의심할 수 있습니다.

(아나필락시스 발생률 : 접종 100 만회 당 11.1 건)

출처 : 해외 제 I / II / III 상 시험 (C4591001 시험) 및 국내 제 I / II 상 시험 (C4591005 시험)



- 가려움증
- 두드러기
- 홍반
- 피부발진



- 복통, 메스꺼움
등



- 시각 이상



- 목이 쉼
- 재채기
- 목이 가려움
- 호흡곤란
등



- 창백
- 의식소실
등

접종 후 잠시 동안 접종기관에 머물러 주시고 **이러한 증상이 나타날 시에는 즉시 접종기관의 의사와 간호사 등에게 알려 주십시오.**

- 만일, 접종 기관에서 귀가 후 위의 증상 등이 나타날 경우에는 오사카부가 설치한 24 시간 전문 상담 창구로 문의하십시오.

심각한 증상이 발생한 경우

오사카부 신종코로나 백신 전문 상담원 창구

☎ 0570-012-336/06-6635-2047

24 시간 토, 일, 공휴일도 대응 ※ 일본어 대응에 한함



상세 내용 · 최신 정보는
QR코드 스캔
(오사카부 HP)

예방접종으로 인한 건강피해에 대한 보상 (예방접종 건강피해 구제제도)

- 코로나 19 백신 접종으로 인한 피해가 발생했을 경우에는 예방접종법에 따른 구제 (의료비 · 장애연금 등의 지급)를 받을 수 있습니다. 신청에 필요한 절차 등은 주민표가 있는 시정촌(市町村 · 기초지방자치단체)에 문의하십시오. 심사에서 피해가 인정된 경우에 시정촌으로부터 지급됩니다.

작성

국제교류센터 네트워크 오사카

☎06-6966-2400